ARINO®
SEEDS

મગફળી મહત્વ ઉત્પાદન મેળવવા નીચે મુજબ ખાતરનો ઉપયોગ કરી શકાય.

ખાતર	પ્રમાણ/વિઘા	પ્રમાણ/એકર	મળતા તત્વો
છાણીયુ ખાતર	૨ ટન	૫ ટન	C
યુરીયા	૧૦ કિલો	૨૫ કિલો	N
સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ	૫૦ કિલો	૧૨૫ કિલો	P, S, Ca
મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	૧૦ કિલો	૨૫ કિલો	K
બેન્ટોનાઈટ સલ્ફર	૪ કિલો	૧૦ કિલો	S
મેંગ્નેશીયમ સલ્ફેટ	૮ કિલો	૨૦ કિલો	Mg, S
જીપ્સમ	૭૫ કિલો	૧૮૮ કિલો	Ca, S
ફેરસ સલ્ફેટ	૮ કિલો	૨૦ કિલો	Fe, S
ઝીંક સલ્ફેટ	૪ કિલો	૧૦ કિલો	Zn, S
બોરોન	૦.૫ કિલો	૧.૨૫ કિલો	B

સારૂ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ખાતરની ભલામણ

ઉપરોક્ત ખાતર જમીન ચકાસણી રીપોર્ટના આધારે જરૂરીયાત મુજબ ફેરફાર કરી ઉપયોગ કરવો.

ઉપાયો : (૧) ક્ષાર પ્રતિરોધક જાતની પસંદગી દ.ત. ઉભડી જાતો, (૨) જમીન સુધારકો ઉપયોગ કરવો - જીપ્સમ, છાણીયુ ખાતર, ટાંચ, પ્રેસમડ વિગેરે (૩) ખારી જમીનમાં યુરીયા અને ભાસ્મીક જમીનમાં એમોનીયા જ્યારે ખારી જમીનમાં સુપર ફોસ્ફેટ અને ભાસ્મીક જમીનમાં **DAP** આપવું. ભાસ્મીક જમીનમાં ઝીંક સલ્ફેટ ૨૫ કિલો/હેક્ટર આપવું.

D - વરસાદ અને પિયત સંબંધિત પ્રશ્નો.

કટોકટીની અવસ્થાએ એ ભેજની અછતથી મગફળીના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો

કટોકટી અવસ્થા	ભેજની અછત (વાવણી બાદ દિવસો)	પુરતા ભેજની સરખામણીમાં અછતને લીધે ઉત્પાદનમાં થતો ઘટાડો
ફુલ આવવા	૨૮ - ૪૮	૧૨.૪%
સુયા બેસવા	૪૦ - ૬૦	૨૨.૦%
ડોડવાનો વિકાસ	૫૫ - ૭૫	૩૬.૦%
ડોડવાની પરીપક્વતા	૭૫ - ૯૫	૦૮.૭%

આધાર : ગોળકિયા અને પટેલ ૧૯૮૮

ઉત્પાદન ઉપર પાણીથી ઉત્પાદનમાં અસર

પાણીની અછત હોય ત્યારે તેનો ઉપાય :

(૧) પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
(૨) ૨% પોટેશીયમનો ૩૦ અને ૪૫ દિવસે છંટકાવ કરવો
(૩) N.A.A. અંતસ્ત્રાવનો 25 PPM પ્રમાણે ૩૦ - ૪૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.

અવિરત કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા.લી.

Survey No 456/3, Opp. Kishan Cattel Feed, B/h. Auro School,
Gundala Road, GONDAL-360 311(Gujarat) India.
Cust. Care No. : Gujarat - 98252 31210 / 94264 80462 , Rajsthan - 94140 60570

ARINO® SEEDS